



## **PROVA NON ESTRATTA**

# **PROVA PRATICA 1**

### **1. QUALI DELLE SEGUENTI SINDROMI PUO' CAUSARE LA LESIONE DEL NERVO RADIALE:**

- a) sindrome della mano ad artiglio
- b) sindrome del tunnel tarsale
- c) sindrome del tunnel carpale
- d) sindrome della mano cadente

### **2. IL TEST "LIFT OFF TEST" VIENE UTILIZZATO PER VALUTARE:**

- a) la forza o eventuale lesione del sottoscapolare
- b) la forza o eventuale lesione del trapezio
- c) la forza o eventuale lesione del bicipite brachiale
- d) la forza o eventuale lesione del legamento crociato anteriore

### **3. QUALE TRA LE SEGUENTI NON È UNA TECNICA "PNF" (FACILITAZIONI NEUROMUSCOLARI PROPRIOCETTIVE):**

- a) contrazione-rilasciamento
- b) stabilizzazione ritmica
- c) informazione sensitiva coscientizzata
- d) inversione lenta-tenuta-rilasciamento

### **4. IL TEST DI JOBE PERMETTE DI VALUTARE LA FORZA DI:**

- a) muscolo piriforme
- b) muscolo sovraspinato
- c) muscolo abduttore del pollice
- d) muscolo coraco-brachiale

**5. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È FALSA:**

- a) La BPCO è una patologia ostruttiva delle vie aeree superiori
- b) Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio per la BPCO
- c) Tosse e dispnea sono caratteristici della BPCO
- d) La BPCO è una patologia transitoria e reversibile grazie al trattamento farmacologico e fisioterapico

**6. LA DISFAGIA È:**

- a) un disturbo della deglutizione
- b) un disturbo attentivo associato ad una lesione cerebrale che riduce la consapevolezza del paziente di un lato del corpo e/o dell'ambiente circostante
- c) un disturbo della memoria
- d) un disturbo dell'articolazione del linguaggio

**7. IL FISIOTERAPISTA SVOLGE CON TITOLARITÀ E AUTONOMIA PROFESSIONALE:**

- a) procedure diagnostiche invasive e non invasive
- b) procedure di valutazione funzionale
- c) procedure assistenziali per la somministrazione dei farmaci
- d) procedure di refertazione di test laboratoristici

**8. LA SCALA FUGL-MEYER:**

- a) è solo uno strumento di valutazione della performance funzionale dell'arto superiore del paziente emiplegico
- b) è una scala di misura dell'impairment ed è specifica per gli esiti di ictus cerebrale
- c) è uno strumento di misura che valuta la performance del paziente atassico
- d) è uno strumento di misura che valuta la performance del paziente mieloleso

**9. LA PREVENZIONE DELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA (TVP) NEI PAZIENTI CON LESIONE MIDOLLARE VA ATTUATA ATTRAVERSO LE SEGUENTI AZIONI:**

- a) eparina immobilizzazione calze elastiche
- b) eparina e immobilizzazione
- c) immobilizzazione prolungata
- d) eparina mobilizzazione precoce e calze elastocompressive

**10. QUALE È L'ARTICOLARITA' CONSENTITA DOPO INTERVENTO DI ARTROPROTESI SI GINOCCHIO:**

- a) 70/80°
- b) 90°/110°
- c) 50°/60°
- d) 130°/140°

**11. NELLA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE EMIPARETICO, PER FAVORIRE IL CARICO SU ENTRAMBI GLI ARTI INFERIORI È UTILE PROPORRE ESERCIZI IN CUI:**

- a) il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- b) il paziente si trova di fronte alle parallele
- c) il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambi le mani
- d) il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

**12. QUALE FRA I SEGUENTI SEGNI È DI FREQUENTE RISCONTRO IN PAZIENTI CHE ABBIANO RIPORTATO UNA LESIONE NERVOSA PERIFERICA?**

- a) ipertonia
- b) segno di Babinski
- c) presenza di sincinesie
- d) perdita o riduzione della motilità volontaria

**13. QUALE TRA LE SEGUENTI SCALE DI VALUTAZIONE DELLA DISPNEA È VALIDATA PER IL PAZIENTE BPCO?**

- a) VAS Visual Analogic Scale
- b) NRS Numeric Rating Scale
- c) CAT Copd Assessment Test
- d) BDI Baseline Dispnea Index

**14. L'APPARECCHIATURA DENOMINATA ASSISTENTE TOSSE:**

- a) può essere applicata solo con interfaccia oronasale
- b) è utile nei casi di tosse inefficace
- c) non può essere prescritta se al paziente è già stato prescritto un ventilatore polmonare
- d) tutte le precedenti

**15. QUANDO L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PUÒ ESSERE CONSIDERATA ESERCIZIO TERAPEUTICO?**

- a) quando ha una durata di almeno 15 minuti
- b) in ogni caso essendo un suo sinonimo
- c) mai, perché sono due modalità diverse
- d) solo quando si utilizzano gesti funzionali

**16. IL SEGNO DELLO STEPPAGE O PIEDE CADENTE:**

- a) può essere indicatore di una debolezza dei muscoli flessori di anca
- b) può essere indicatore di una debolezza dei muscoli estensori di ginocchio
- c) può essere indicatore di debolezza dei dorsi-flessori della caviglia
- d) può essere indicatore di debolezza dei planta-flessori della caviglia

**17. UNA ORTESI DI TIPO AFO:**

- a) può correggere una scoliosi
- b) può correggere un piede cadente
- c) serve a ridurre il dolore lombare acuto
- d) è sempre prescritta dal medico dopo intervento di ricostruzione di LCA

**18. DURANTE LA CONTRAZIONE ISOMETRICA IL MUSCOLO:**

- a) non sviluppa tensione
- b) rimane a riposo
- c) sviluppa tensione ma non produce movimento esterno
- d) non può agire da fissatore

**19. DI QUESTI MUSCOLI NON È UN FLESSORE DEL GOMITO**

- a) brachiale
- b) brachio-radiale
- c) bicipite femorale
- d) bicipite brachiale

**20. LA SCALA DI VALUTAZIONE MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC)**

- a) è una scala di 6 items
- b) prevede resistenza
- c) valuta la forza muscolare
- d) tutte le precedenti